

PRODUKTDATABLAD

Xylocain gel

Xylocain gel virker lokalbedøvende. Den virker i løbet af få minutter. Xylocain salve kan bruges af voksne og barn i alle aldre til lokalbedøvelse ved forskellige undersøgelser af endetarmen, luftvejene eller ved oplægning af kateter. Xylocain kan også bruges til lindring af smerter ved betændelse i urinrøret eller blæren og til lindring af smerte efter omskæring af drenge.



Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.

Ingredienser:	Aktivt stof: Lidocainhydrochlorid. Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose, natriumhydroxid og/eller saltsyre, sterilt vand, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216).
Indikation:	Anvendes til lokalbedøvelse ved forskellige undersøgelser af endetarmen, luftvejene eller ved oplægning af kateter. Voksne: Efter lægens anvisning, eller netop den mængde, som er tilstrækkelig til at dæmpe smerterne. Smør gelen på i et tyndt lag, som netop dækker det hudområde, der skal behandles. Gentag først behandlingen ved behov og efter det længst mulige interval. Ved ældre patienter bør dosis justeres efter lægens anvisninger
Dosering:	Børn: Ikke egnet til børn under 2 år uden lægens anvisning. Til børn under 12 år bør dosis ikke overskride 6 mg/kg. Til et barn som vejer: <ul style="list-style-type: none">• 15kg må der højst bruges 4,5g gel per gang• 20kg må der højst bruges 6g gel per gang• 30kg må der højst bruges 9g gel per gang
Kontraindikationer:	Xylocain bør ikke bruges mere end 4 gange per døgn Allergi overfor indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen Hvis lægen har brugt Xylocain gel i munden eller svælgen, bør der tages særligt hensyn, da der opstår risiko af at få mad galt i halsen og at bide sig selv grundet følelsesløshed. Derfor bør der ikke spises de første 2 timer efter bedøvelsen.
Advarsler og forsigtighedsregler:	Kontakt lægen inden brug, hvis du: <ul style="list-style-type: none">• Lider af forstyrrelser i hjerterytmen• Lider af hjertesvigt• Har dårlig lever• Har dårlige nyrer• Har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme i nervesystemet

PRODUKTDATABLAD

Xylocain gel

- Har porfyri, en sjælden stofskiftesygdom
- Vil smøre Xylocain gel på åbne sår, slimhinder, forbrændinger eller områder med betændelse.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn og ved temperaturer under 25°C

Holdbarhed: Se holdbarhedsdato på emballagen.

Håndtering og destruktion: Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
7552170	Xylocain	Håndkøbsmedicin gel 2% Astra	30g	Æske a 10 stk.	109398

ANSVARLIGT FIRMA

Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga, Sverige