

# PRODUKTDATABLAD

## Emla plaster

Emla plaster er et håndkøbslægemiddel, som virker lokalbedøvende på huden. Produktet indeholder de aktive lægemiddelstoffer lidocain og prilocain, der virker lokalbedøvende på huden.

Emla plaster anvendes til lokalbedøvelse af huden i en kortere periode, f.eks. inden et medicinsk indgreb som indstik af en kanyle og mindre hudoperationer. Plastret virker ved at gøre huden følelsesløs, så smerte ikke føles på huden. Du kan dog stadig mærke tryk og berøring på det pågældende sted.



<b>Ingredienser:</b>	Carboxylopolymethylen, hydrogeneret og polyoxileret ricinusolie, natriumhydroxid, rensat vand. <b>Aktive stoffer:</b> Lidocain 25mg/g og Prilocain 25mg/g.
<b>Indikation:</b>	Velegnet til lokalbedøvelse af huden i en kortere periode, f.eks. inden et medicinsk indgreb som indstik af en kanyle og mindre hudoperationer.
<b>Kontraindikationer:</b>	Ikke egnet til anvendelse på rifter, hudafskrabninger eller sår, på områder med hududslæt eller eksem, omkring øjnene eller i munden. Produktet kan interagere med andre lægemidler. Rådfør dig med en læge forud for anvendelse.
<b>Anvendelse:</b>	Sørg for at huden, som skal bedøves, er helt ren og tørt. Fjern aluminiumslaget fra selve plastret, ved at trække det forsigtigt af. Sørg for IKKE at røre den hvide pude, som indeholder de aktive lægemiddelstoffer. Påfør plastret på huden. Tryk plastret godt fast i kanten og sørg for ikke at trykke på idten, da det kan få lægemidlet til at trække ind under klædemidlet. Påføringstidspunktet kan med fordel markeres direkte på kanten af plastret med en kuglepen. Lad plastret sidde i mindst én time. Ved børn under 3 måneder må plastret ikke sidde på huden mere end én time.
<b>Dosering:</b>	Emla plaster skal altid anvendes efter lægens anvisning. Plastret påføres huden ca. 1 time før indgreb. Plastret tages af igen lige inden indgrebet påbegyndes. <b>Nyfødt og småbørn fra 0-2 måneder:</b> Et plaster påføres på det udvalgte område af huden. Plastret påføres huden højst 1 time før indgreb. Der må kun påføres en enkelt dosis inden for et tidsinterval på 24 timer. Plastrets størrelse gør det mindre egnet til anvendelse på visse dele af kroppen hos nyfødte og spædbørn. <b>Småbørn fra 3-11 måneder:</b> Højst to plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføres ca. 1 time for indgreb. <b>Børn fra 1-5 år:</b> Højst 10 plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføres ca. 1 time, højst 5 timer. <b>Børn fra 6-11 år:</b> Højst 20 plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføres ca. 1 time, højst 5 timer.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
<b>Holdbarhed:</b>	Se datomærkning på emballagen.
<b>Bortskaffelse:</b>	Bortskaffes på forbrændingen.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
7552151	EMLA	Håndkøbsmedicin, plaster, kvadratisk	6,3 x 6,3 cm	Pk. á 2 stk.	388272
7552152	EMLA	Håndkøbsmedicin, plaster, kvadratisk	6,3 x 6,3 cm	Pk. á 20 stk.	558386

### For sundhedsfagligt personale